

Po zákroku

- Nejbližších 14 dnů, prosím, neprovádějte náročnou fyzickou aktivitu a **nekoupejte se**. Sprchovat se můžete. Na ránu nepoužívejte žádné mýdlo.
- Po výkonu je vhodné ránu nepřímo **chladit**.
- Po operacích na penisu nebo šourku je vhodné po výkonu používat **elastické spodní prádlo** a volné kalhoty.
- V případě bolesti je možné užít běžná **analgetika** např. Novalgin 1 tabletu, Paralen 500mg 2 tablety nebo Ibalgin 400mg 1 tableta maximálně 4x denně.

V případě **komplikací**, jako neustávající krvácení z rány, markantní zvětšení a modré zbarvení okolí rány, silné bolesti či teploty nás, prosím, kontaktujte a vyhledejte odbornou pomoc.

- Ambulance Urologické kliniky 3. LF UK, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 50, Praha 10. Otevřeno nepřetržitě.
- Ambulance Urologické kliniky 1. LF UK, Všeobecné fakultní nemocnice, Ke Karlovu 6, Praha 2. Otevřeno nepřetržitě.

Následná péče

- **Sterilní krytí** na ráně ponechte alespoň 3 dny, při průsaku je vhodné krytí vyměnit a ránu ošetřit desinfekcí.
- Ránu je vhodné od třetího dne ošetřovat 2x denně odvarem z **heřmánku**, či gelem **UroTiab**, které zajistí rychlejší hojení.
- Pro rychlejší vymizení toku je doporučením vhodné užívat **Aescin** 3x denně 2 tablety, který je volně dostupný, až do úplného vymizení otoku.
- Při užívání antibiotik vřele doporučujeme užívat současně i **probiotika**, například Biopron 9 Premium, a to ještě nejméně 3 dny po vysazení antibiotické léčby.

Přejeme Vám rychlé a nekomplikované hojení.

V případě dotazů či obtíží nás, prosím, kontaktujte.

MUDr. Lukáš Bittner, FEBU, FECSM, tel: +420 777/824 337

MUDr. Libor Zámečník, PhD., FEBU, FECSM, tel: +420 603/204 070

MUDr. Tomáš Hradec, FEBU, tel: +420 728/482 907



**Andrologická
klinika**

www.andrologickaklinika.cz

Tel.: +420 725 438 540

info@andrologickaklinika.cz

Andrologická klinika

Nemocnice Iscare, 7. patro

Českomoravská 2510/19

190 00 Praha 9